

## 13 医療機関への搬送の判断基準

### 頭部・顔面の外傷

頭部外傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・意識障害、ショック症状</li> <li>・耳や鼻から出血</li> <li>・脳圧亢進症状</li> <li>・開放性損傷</li> </ul>
眼の外傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・急激な視力障害が出現</li> <li>・外傷</li> <li>・激しい眼痛、異物反応の強い時</li> <li>・光視、飛蚊症、視野障害出現時</li> </ul>
鼻の外傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・外傷、打撲などで出血が止まらない</li> <li>・顔、鼻の変形・腫脹</li> <li>・口呼吸（鼻呼吸ができない）</li> <li>・髄膜刺激症状（めまい・嘔気・頭痛）</li> </ul>
歯部の外傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下顎骨折の疑い</li> <li>・永久歯の歯牙脱臼</li> <li>・出血が止まらない時</li> </ul>
耳の外傷	<ul style="list-style-type: none"> <li>・痛みが次第に強くなる時</li> <li>・出血が止まらない時</li> <li>・外耳道を損傷するおそれのある異物がある時</li> </ul>

### 胸部・腹部の外傷

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ショック症状（手足の冷感、顔・爪・唇色）</li> <li>・意識障害のある時</li> <li>・多発肋骨骨折・肺・胸膜の損傷、心臓に達する損傷が考えられる時</li> <li>・呼吸回数↑、努力様呼吸、頻脈、唇のチアノーゼなどの出現</li> <li>・強い胸痛、呼吸困難、痰の血液混入</li> <li>・胸壁の奇異運動</li> <li>・腹部臓器の損傷、腹腔内出血の疑い</li> <li>・ショック症状、吐き気</li> <li>・腹痛、その増強度</li> <li>・腹部膨満、腹壁緊張のある時</li> <li>・脱力感、血尿</li> <li>・縫合の必要な創がある時</li> <li>・無口、表情の乏しさ</li> </ul>
--

### 四肢の外傷

<ul style="list-style-type: none"> <li>・切断</li> <li>・ショック状態</li> <li>・大出血</li> <li>・土などで汚れた深い創がある（釘・木片）</li> <li>・痛み、腫脹、運動障害、変形があり骨折が疑われる時</li> <li>・縫合が必要な時</li> </ul>
---

### 男性器・女性器の外傷

男性器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陰部に激しい痛みや腫れ（持続・増強）</li> <li>・外傷があり出血</li> <li>・意識障害、ショック症状</li> <li>・高熱で下がらない</li> <li>・排尿障害</li> </ul>
女性器	<ul style="list-style-type: none"> <li>・月経以外の出血</li> <li>・創部の疼痛がひどく、腫脹のある時</li> <li>・月経時…出血多量で顔色が悪く、ぐったり・頻脈↑、血圧↓</li> <li>・腹痛がひどく、だんだん出血量が増加</li> </ul>

### 熱傷

<ul style="list-style-type: none"> <li>・意識障害、ショック状態</li> <li>・顔面に負傷した場合（眼・鼻・口・耳の重要器官に及んだ場合）</li> <li>・四肢関節部に負傷（機能障害を残すおそれあり）</li> <li>・外陰部に負傷（排尿・排便傷害を起こすおそれあり）</li> <li>・深度Ⅱ度以上の熱傷時</li> </ul>
---

